

Zomacton 10mg / 조맥톤주 10mg (소마트로핀)

	제품명
	조맥톤주10밀리그램 (소마트로핀)
	원료약품 및 그 분량
	- 주제 1바이알 중 - 주성분: 소마트로핀(별규) 10.0밀리그램 - 첨가제: 만니톨, 인산이나트륨12수화물, 인산이수소나트륨이수화물 - 첨부용제(1mL 시린지): m-크레졸(보존제), 주사용수 (용제)
의약품통합정보시스템	
의약품통합정보시스템 바로가기 >	

효능 및 효과

1. 뇌하수체 성장호르몬 분비 부족으로 인한 소아의 성장부전치료
2. 터너증후군에 의한 성장 부전 치료

용법 및 용량

- 1) 이 약의 용법 및 용량은 환자마다 개별화되어야 한다.
- 2) 골단융합이 발생하면 치료를 중지한다.
- 3) 성장호르몬 요법에 대한 반응은 시간에 따라 감소하는 경향이 있다. 그러나 치료 첫해에 성장속도 증가에 실패하였을 경우에는 순응도 측정과 갑상선 기능저하증, 영양부족, 뼈의 고령화 같은 다른 성장장애의 원인들에 대해 철저히 평가해야 한다.
- 4) 뇌하수체 성장호르몬 결핍에 의한 소아 성장부전 치료시는 1주일에 0.5~0.70IU/kg (0.17~0.23mg/kg) 또는 12IU/m²(4mg/m²)를 6~7회 분할하여 피하주사한다.
- 5) 터너증후군에 의한 성장부전 치료시는 1주일에 1.0IU/kg(0.3mg/kg) 또는 24IU/m²(8mg/m²)를 6~7회 분할하여 피하주사한다

